



# MAGNESIE SAN PELLEGRINO ANISEE 90 POUR CENT

## Poudre pour suspension buvable

### Hydroxyde de magnésium

**Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Dans cette notice:**

1. Qu'est-ce que MAGNESIE SAN PELLEGRINO ANISEE 90 POUR CENT, poudre pour suspension buvable et dans quel cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre MAGNESIE SAN PELLEGRINO ANISEE 90 POUR CENT, poudre pour suspension buvable?
3. Comment prendre MAGNESIE SAN PELLEGRINO ANISEE 90 POUR CENT, poudre pour suspension buvable?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver MAGNESIE SAN PELLEGRINO ANISEE 90 POUR CENT, poudre pour suspension buvable?
6. Informations supplémentaires.

#### 1. QU'EST-CE QUE MAGNESIE SAN PELLEGRINO ANISEE 90 POUR CENT, poudre pour suspension buvable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE?

**Classe pharmacothérapeutique**

LAXATIF OSMOTIQUE (A: appareil digestif et métabolisme).

**Indications thérapeutiques**

Ce médicament est un laxatif. Il est indiqué dans le traitement de la constipation.

#### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE MAGNESIE SAN PELLEGRINO ANISEE 90 POUR CENT, poudre pour suspension buvable?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

**CONTRE-INDICATIONS**

**Ne prenez jamais MAGNESIE SAN PELLEGRINO ANISEE 90 POUR CENT, poudre pour suspension buvable, dans les cas suivants:**

- certaines maladies de l'intestin et du côlon,
- en cas de douleurs abdominales (douleurs du ventre),
- en cas de constipation chronique (constipation de longue durée).

Ce médicament *NE DOIT GENERALEMENT PAS ETRE UTILISE*, sauf avis contraire de votre médecin, en association avec les quinidiniques.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

**PRECAUTIONS D'EMPLOI**

**Faites attention avec MAGNESIE SAN PELLEGRINO ANISEE 90 POUR CENT, poudre pour suspension buvable:**

*Constipation occasionnelle:*

Elle peut être liée à une modification récente du mode de vie (voyage). Le médicament peut être une aide en traitement court. Toute constipation récente inexpliquée par le changement du mode de vie, toute constipation accompagnée de douleurs, de fièvre, de gonflement du ventre doit faire demander l'avis au médecin.

*Constipation chronique (constipation de longue durée):*

Elle peut être liée à deux causes:

- soit une maladie de l'intestin qui nécessite une prise en charge par le médecin.
- soit à un déséquilibre de la fonction intestinale dû aux habitudes alimentaires et au mode de vie.

Le traitement comporte entre autres:

- une augmentation des apports alimentaires en produits d'origine végétale (légumes verts, crudités, pain complet, fruits ...),
- une augmentation de la consommation d'eau et de jus de fruit,
- une augmentation de l'activité physique (sport, marche...),
- une rééducation du réflexe de défécation,
- parfois, l'adjonction de son à l'alimentation.

Il est utile de prendre conseil auprès de votre médecin ou de votre pharmacien.

*Cas particulier de l'enfant:*

Chez l'enfant le traitement de la constipation est basé sur des mesures d'hygiène de vie et de diététique: notamment utilisation des bonnes quantités d'eau avec les poudres de lait infantiles, alimentation riche en produits d'origine végétale, adjonction de jus de fruit.

**MISES EN GARDE SPECIALES**

Ce médicament contient du saccharose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose (maladie héréditaire rare).





Ce médicament contient du saccharose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose (maladie héréditaire rare).

Ce médicament contient de faibles quantités d'éthanol (alcool), inférieures à 100 mg par dose (cuillère-mesure).

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

#### INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN, en particulier un traitement par les quinidiniques.

#### GROSSESSE ET ALLAITEMENT:

##### Grossesse

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

##### Allaitement:

La prise de ce médicament est déconseillée pendant l'allaitement.

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.

#### CONDUITE DES VEHICULES ET UTILISATION DES MACHINES

Les effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines n'ont pas été étudiés.

#### EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE

Informations importantes concernant certains composants de MAGNESIE SAN PELLEGRINO ANISEE 90 POUR CENT, poudre pour suspension buvable

Excipients: saccharose, huile essentielle d'anis, alcool.

Excipients à effet notoire: saccharose, alcool.

### 3. COMMENT PRENDRE MAGNESIE SAN PELLEGRINO ANISEE 90 POUR CENT, poudre pour suspension buvable?

#### Posologie

##### RESERVE A L'ADULTE

Une demi à 1 cuillère-mesure par jour, diluée dans un verre d'eau le matin à jeun ou le soir au coucher.

#### Mode d'administration

Voie orale.

#### Fréquence d'administration

Le matin à jeun ou le soir au coucher.

#### Durée du traitement

Si l'effet du traitement est insuffisant, il ne faut pas augmenter la dose ni prolonger l'usage mais demander avis à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### Surdosage

Si vous avez pris plus de MAGNESIE SAN PELLEGRINO ANISEE 90 POUR CENT, poudre pour suspension buvable que vous n'auriez dû:

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS?

Comme tous les médicaments, MAGNESIE SAN PELLEGRINO ANISEE 90 POUR CENT, poudre pour suspension buvable est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Il est possible que surviennent des douleurs du ventre, une diarrhée. Il faut arrêter le traitement et prévenir votre médecin.

SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

### 5. COMMENT CONSERVER MAGNESIE SAN PELLEGRINO ANISEE 90 POUR CENT, poudre pour suspension buvable?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser MAGNESIE SAN PELLEGRINO ANISEE 90 POUR CENT, poudre pour suspension buvable après la date de péremption mentionnée sur la boîte. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C à l'abri de l'humidité.

### 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient MAGNESIE SAN PELLEGRINO ANISEE 90 POUR CENT, poudre pour suspension buvable?

La substance active est: Hydroxyde de magnésium: 90g pour 100g de poudre

Une cuillère-mesure (4,5g) contient 4,05g d'hydroxyde de magnésium

Les autres composants sont: Saccharose, huile essentielle d'anis, alcool.

Qu'est ce que MAGNESIE SAN PELLEGRINO ANISEE 90 POUR CENT, poudre pour suspension buvable et contenu de l'emballage extérieur?

Poudre pour suspension buvable présentée en flacon 90g (PVC) + cuillère-mesure 4,5g (polypropylène).

#### Exploitant

 LABORATOIRES AUVEX  
20, rue des Bouleaux  
63100 CLERMONT-FERRAND  
FRANCE

#### Fabricant

EUROPHARTECH – EUROPEENNE DE PHARMACOTECHNIE  
34, Rue Henri Matisse  
63370 LEMPDES  
FRANCE

#### Date de révision de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 25 mai 2009





## BON À TIRER.

Vous nous obligeriez en examinant minutieusement cette épreuve et en nous signalant de façon lisible les corrections éventuelles. Nous nous verrions en effet dans l'obligation de décliner toute responsabilité si une erreur n'avait pas été signalée. Le renvoi du présent bon à tirer tient lieu d'acceptation de paiement de la facture afférente à l'exécution de la commande et vaut reconnaissance de dette au sens de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 82 al. 1 LP).

**La libération pour l'impression ne peut être faite que par e-mail, dont le libellé comporte au moins le numéro du dossier MTL et le numéro de l'épreuve.**

N° dossier MTL:	11'1629	Grandeur des codes-barres selon spécifications:	-
N° article Client:	-	Dist. (2 mm) autour des codes-barres respectée:	-
N° article Vifor / Version:	107497/03	Norme au recto:	oui
Réf. commande:	-	Norme au verso:	oui
Format ouvert:	148 x 210 mm	Corps texte (min. 8pts) respecté:	-
Format plié:	148 x 53 mm	Date:	14.10.2011
Code-barre N°:	sans code	Epreuve N°:	2
Couleurs d'impression: (nuancier Pantone)	Recto: noir Verso: noir		
Bascuage:	<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">normal</div> <div style="font-size: 20px;">↔</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">normal</div> </div>		
Commentaire:	original = 1 pdf fourni		
Décision:	-		

### Contact:

Valérie Gumy – Tél. dir.: 026 409 74 16 – Fax: 026 401 13 15  
E-mail: imprimerie@mtlsa.ch

### Imprimerie MTL SA

Case postale 967 – 1701 Fribourg – Tél. 026 401 13 13

