

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice car elle contient des informations importantes.

- Ce médicament est une spécialité d'AUTOMEDICATION qui peut être utilisée sans consultation ni prescription d'un médecin.
- La persistance des symptômes, l'aggravation ou l'apparition de nouveaux troubles, imposent de prendre un avis médical.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien.

RENNIE, comprimé

COMPOSITION QUALITATIVE

- Carbonate de calcium-----680,00 mg
- Carbonate de magnésium lourd ----- 80,00 mg

Excipients : amidon de pomme de terre, amidon de maïs pré-gélatinisé, stéarate de magnésium, talc, paraffine liquide légère, arôme menthe, arôme citron, saccharose.

Pour un comprimé

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé. Etais de 48 et 96 comprimés.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ANTIACIDE

(A : appareil digestif et métabolisme)

NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT / FABRICANT

Bayer Santé Familiale
33 rue de l'Industrie
74240 Gaillard – France

QUEL(S) CAS POUVEZ-VOUS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament est indiqué chez l'adulte (à partir de 15 ans) dans les brûlures d'estomac et remontées acides.

ATTENTION !

DANS QUEL(S) CAS NE DEVEZ-VOUS PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

VOUS NE DEVEZ PAS PRENDRE ce médicament en cas :

- d'antécédents d'allergie à l'un des composants du comprimé,
- de maladie grave du rein,

- d'hypercalcémie (taux anormalement élevé de calcium dans le sang).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPECIALES

- **Vous ne devez utiliser ce médicament qu'après avis de votre médecin :**

- si vos troubles sont associés à une perte de poids,
- si vous avez des difficultés à avaler ou une gêne abdominale persistante,
- si vous souffrez de troubles de la digestion pour la première fois ou si ces troubles se sont modifiés récemment,
- si vous souffrez d'une maladie des reins.

- En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase (maladies métaboliques rares).

NE LAISSEZ PAS CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.

N'UTILISEZ CE MEDICAMENT QU'AVEC PRECAUTION

- Si l'intensité et/ou la fréquence des symptômes persistent sans amélioration ou s'aggravent après 10 jours de traitement, n'augmentez pas la dose, mais prenez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

- Si vous êtes conduit à dépasser 4 à 8 comprimés par jour, ce traitement devra être de courte durée. Il ne devra pas être poursuivi après la disparition des symptômes.

Vous ne devez pas dépasser 12 comprimés par jour.

- Ce médicament contient 475 mg de saccharose par comprimé : en tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou de diabète.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

| |
|--|
| <p>Ce médicament contient des antiacides (carbonate de calcium et carbonate de magnésium). D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir mode d'emploi et posologie).</p> |
|--|

Les antiacides peuvent diminuer l'effet de nombreux autres médicaments. Il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

Il convient de ne pas prendre au même moment l'antiacide et un autre médicament.

Cet autre médicament pourra être pris à distance de l'antiacide (par exemple 2 heures avant).

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

SI VOUS ETES ENCEINTE OU SI VOUS ALLAITEZ

Ne prenez pas ce médicament sans avoir demandé l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Grossesse :

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Allaitement :

L'utilisation de ce médicament est possible pendant l'allaitement.

LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NECESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE PAR LE PATIENT.

Saccharose.

DEVEZ-VOUS UTILISER CE MEDICAMENT

POSOLOGIE

RESERVE A L'ADULTE (à partir de 15 ans).

- 1 à 2 comprimés au moment des brûlures d'estomac ou des remontées acides, soit 4 à 8 comprimés par jour.
- En cas de douleurs plus intenses, la posologie pourra être portée, pour une brève période, à 12 comprimés par jour.
- La durée du traitement sera limitée à 10 jours.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie orale.

Sucez ou croquez le ou les comprimés.

FREQUENCE ET MOMENT AUXQUELS CE MEDICAMENT DOIT ETRE ADMINISTRE

Prenez 1 à 2 comprimés au moment des douleurs. Respectez la posologie maximale.

DUREE DU TRAITEMENT

La durée d'utilisation est limitée à 10 jours.

CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE.

En cas de surdosage, des troubles du transit peuvent apparaître (diarrhée). Dans ce cas, il est recommandé d'interrompre le traitement et de consulter un médecin.

QUELS SONT LES EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS DU MEDICAMENT

CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

- Possibilité de troubles digestifs (diarrhées).
- A doses fortes et prolongées, survenue possible d'hypercalcémie (taux anormalement élevé de calcium dans le sang), de calculs rénaux et de troubles rénaux graves.

SIGNELEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE DE CONSERVATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR

NE LAISSER NI A LA PORTEE NI A LA VUE DES ENFANTS

DE REVISION DE LA NOTICE

Décembre 2003.

D'EDUCATION SANITAIRE

Ce médicament a pour but de soulager vos maux d'estomac.

Les brûlures, aigreurs d'estomac, les remontées acides, peuvent être dues à des modifications de l'alimentation (mets acides ou épicés, boissons alcoolisées...) ou à la prise de certains médicaments (aspirine, anti-inflammatoires...). N'hésitez pas à en parler à votre médecin ou à votre pharmacien.

Afin de limiter l'apparition des symptômes, respectez autant que possible les règles d'hygiène suivantes :

- évitez le tabac et limitez la consommation d'alcool,
- évitez les repas abondants et riches en graisses,
- évitez certains aliments tels que chocolat, épices, piments, jus d'agrumes, boissons gazeuses,
- mangez lentement,
- variez votre alimentation,
- normalisez votre poids,
- évitez la pratique d'un effort important juste après le repas.

**VOTRE PHARMACIEN, VOTRE MEDECIN, CONNAISSENT BIEN LES MEDICAMENTS.
N'HESITEZ PAS A LEUR DEMANDER DES PRECISIONS.
NE LAISSEZ JAMAIS UN MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.**