

OPTICRON® UNIDOSE

CROMOGLICATE DE SODIUM

IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

DÉNOMINATION

OPTICRON® UNIDOSE, collyre en récipient unidose

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Cromogliclate de sodium 0,007 g

Excipients : Chlorure de sodium, eau pour préparations injectables pour un récipient unidose de 0,35 ml.

FORME PHARMACEUTIQUE

Collyre en récipients unidoses de 0,35 ml.

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE

ANTI-ALLERGIQUE LOCAL (S = organes sensoriels)

NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE

Place Lucien Auvert

77020 MELUN Cedex

NOM ET ADRESSE DU FABRICANT

LABORATOIRES UNITHER

Z.I. Longpré - 10 rue André Durouchez

80 052 AMIENS Cedex 02

DANS QUEL CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce collyre est indiqué en cas de maladie de l'œil d'origine allergique (conjonctivite allergique)

ATTENTION !

DANS QUEL CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- Antécédent d'allergie à l'un des composants du collyre.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

PRÉCAUTION D'EMPLOI

NE JAMAIS LAISSER À LA PORTÉE DES ENFANTS.

NE PAS INJECTER, NE PAS AVALER.

Ne pas dépasser la posologie recommandée.

En l'absence d'amélioration comme en cas de persistance des symptômes, prenez un avis médical.

En cas de traitement concomitant par un autre collyre, attendre 15 minutes entre chaque instillation.

Jeter l'unidose après utilisation.

Ne pas conserver l'unidose en vue d'une instillation ultérieure.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MEDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

En cas de traitement concomitant par un autre collyre, attendre 15 minutes entre chaque instillation.

GROSSESSE - ALLAITEMENT

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

POSOLOGIE

- Adulte et enfant : selon la sévérité des symptômes, instillez 1 goutte dans chaque œil, 2 à 6 fois par jour, à intervalles réguliers.

Chez l'enfant un avis médical est nécessaire.

- Ne pas dépasser la posologie recommandée.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie locale.

EN INSTILLATION OCULAIRE.

Lavez-vous soigneusement les mains avant de procéder à l'instillation.

Ouvrez le sachet. Détachez une unidose. Fermez soigneusement le sachet contenant les autres unidoses en repliant le côté ouvert. Ouvrez l'unidose en tournant la partie supérieure plate.

Chaque unidose contient une quantité suffisante de collyre pour traiter les deux yeux.

Instillez 1 goutte de collyre dans le cul de sac conjonctival de l'œil malade en regardant vers le haut, et en tirant légèrement la paupière vers le bas et en évitant le contact de l'embout avec l'œil ou les paupières.

Jetez l'unidose après utilisation. Ne la conservez pas pour une utilisation ultérieure.

FRÉQUENCE ET MOMENT AUXQUELS LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE ADMINISTRÉ

Espacez les 2 à 6 instillations quotidiennes.

En cas de traitement concomitant par un autre collyre, attendez 15 minutes entre chaque instillation.

DURÉE DU TRAITEMENT

Ne prolongez pas le traitement sans avis médical.

En l'absence d'amélioration comme en cas de persistance des symptômes, prenez un avis médical.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS

Possibilité de survenue de réaction allergique aux composants du produit.

SIGNEZ À VOTRE MEDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Conserver le conditionnement primaire dans l'emballage extérieur, à l'abri de la lumière.

Jetez l'unidose après utilisation. Ne la conservez pas pour une utilisation ultérieure.

DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE : Septembre 2002



Place Lucien Auvert - 77020 MELUN CEDEX

