

# NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 12/02/2013

## Dénomination du médicament

**BECILAN 250 mg, comprimé sécable**  
**Chlorhydrate de pyridoxine**

## Encadré

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## Sommaire notice

### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE BECILAN 250 mg, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE BECILAN 250 mg, comprimé sécable ?
3. COMMENT PRENDRE BECILAN 250 mg, comprimé sécable ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER BECILAN 250 mg, comprimé sécable ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### **1. QU'EST-CE QUE BECILAN 250 mg, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

#### **Classe pharmacothérapeutique**

VITAMINE B<sub>6</sub>.  
(A. Appareil digestif et métabolisme).

#### **Indications thérapeutiques**

Ce médicament est indiqué chez l'adulte dans le traitement des carences en vitamine B<sub>6</sub> confirmées par le médecin.

### **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE BECILAN 250 mg, comprimé sécable ?**

#### **Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament**

Sans objet.

### **Contre-indications**

**Ne prenez jamais BECILAN 250 mg, comprimé sécable:**

- en cas d'antécédent d'allergie à l'un des constituants,
- en association avec la lévodopa.

### **Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales**

**Faites attention avec BECILAN 250 mg, comprimé sécable:**

#### **Précautions d'emploi**

Ce médicament ne doit pas être utilisé de façon prolongée.

En raison de la présence de pyridoxine, l'association à la lévodopa, qui peut réduire l'activité de la L-Dopa, nécessite des précautions d'emploi (voir rubrique 4.5).

### **Interactions avec d'autres médicaments**

#### **Prise ou utilisation d'autres médicaments**

Ce médicament est contre-indiqué en association avec la lévodopa.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### **Interactions avec les aliments et les boissons**

Sans objet.

### **Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives**

Sans objet.

### **Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement**

#### **Grossesse et allaitement**

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre ce traitement.

En cas d'allaitement, éviter de prendre ce médicament.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

### **Sportifs**

Sans objet.

### **Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines**

Sans objet.

### **Liste des excipients à effet notoire**

**Liste des excipients à effet notoire:** amidon de blé.

### **3. COMMENT PRENDRE BECILAN 250 mg, comprimé sécable ?**

## Instructions pour un bon usage

Sans objet.

## Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

### Posologie

RESERVE A L'ADULTE.

1 à 4 comprimés par jour.

*CE MEDICAMENT VOUS A ETE PERSONNELLEMENT DELIVRE DANS UNE SITUATION PRECISE:*

- *IL PEUT NE PAS ETRE ADAPTE A UN AUTRE CAS*
- *NE PAS LE CONSEILLER A UNE AUTRE PERSONNE*

### Mode et voie d'administration

Voie orale.

Les comprimés sont à avaler avec un peu d'eau.

### Durée du traitement

Ne pas utiliser de façon prolongée. Respecter les doses préconisées.

## Symptômes et instructions en cas de surdosage

**Si vous avez utilisé plus de BECILAN 250 mg, comprimé sécable que vous n'auriez dû:**

Des manifestations neurologiques à type de somnolence et/ou de paresthésie ont été signalées à fortes doses et/ou en cures prolongées de chlorhydrate de pyridoxine. Ces manifestations sont réversibles à l'arrêt du traitement. Le traitement est symptomatique.

## Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Sans objet.

## Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

### Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, BECILAN 250 mg, comprimé sécable est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- Manifestations neurologiques exceptionnelles et réversibles à l'arrêt du traitement suite à des fortes doses et/ou en cures prolongées.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## 5. COMMENT CONSERVER BECILAN 250 mg, comprimé sécable ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

## Date de péremption

Ne pas utiliser BECILAN 250 mg, comprimé sécable après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

### **Conditions de conservation**

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

### **Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration**

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## **6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES**

### **Liste complète des substances actives et des excipients**

#### **Que contient BECILAN 250 mg, comprimé sécable ?**

##### **La substance active est:**

Chlorhydrate de pyridoxine (Vitamine B<sub>6</sub>) ..... 250,0 mg  
Pour un comprimé sécable.

##### **Les autres composants sont:**

Excipients: Amidon de blé, saccharine sodique, sucre glace amylacé, silice colloïdale hydratée, stéarate de magnésium.

### **Forme pharmaceutique et contenu**

#### **Qu'est-ce que BECILAN 250 mg, comprimé sécable et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme de comprimé sécable. Boîte de 40 comprimés.

#### **Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent**

##### ***Titulaire***

**LABORATOIRES THERANOL DEGLAUDE**  
72, RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE  
75008 PARIS

##### ***Exploitant***

**D.B. PHARMA**  
1 BIS RUE DU COMMANDANT RIVIERE  
94210 LA VARENNE SAINT-HILAIRE

##### ***Fabricant***

**CENEXI**  
52, RUE MARCEL ET JACQUES GAUCHER  
94120 FONTENAY SOUS BOIS

#### **Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen**

Sans objet.

#### **Date d'approbation de la notice**

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.**

**AMM sous circonstances exceptionnelles**

Sans objet.

**Informations Internet**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

**Informations réservées aux professionnels de santé**

Sans objet.

**Autres**

Sans objet.