

# Ostéocynésine®

COMPRIMÉ

## FORME ET PRÉSENTATION

Boîte de 60 comprimés

## COMPOSITION

Calcarea ostreica .....	3 DH
Calcarea fluorica .....	3 DH
Calcarea phosphorica .....	3 DH
Sulfur iodatum .....	4 CH
aa q.s.p. 1 comprimé de 0,30 g.	

**Excipients :** saccharose, lactose, stéarate de magnésium

## INDICATIONS

### Médicament homéopathique

Décalcification.

Troubles de la croissance chez l'enfant.

Consolidation des fractures.

Convalescence.

## POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI

2 comprimés 2 à 3 fois par jour. Les comprimés peuvent être sucés, avalés ou écrasés dans un peu d'eau.

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI - MISES EN GARDE

En raison de la présence de saccharose, l'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une

intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

En raison de la présence de lactose, l'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (maladies héréditaires rares).

## EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS

### Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via :

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Ansm) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance  
Site internet: [www.ansm.sante.fr](http://www.ansm.sante.fr)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

Visa 214.417

