

# NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 17/11/2017

## Dénomination du médicament

### ECONAZOLE ARROW 1 %, poudre pour application cutanée

## Encadré

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

## Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que ECONAZOLE ARROW 1 %, poudre pour application cutanée et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser ECONAZOLE ARROW 1 %, poudre pour application cutanée ?
3. Comment utiliser ECONAZOLE ARROW 1 %, poudre pour application cutanée ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ECONAZOLE ARROW 1 %, poudre pour application cutanée ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## 1. QU'EST-CE QUE ECONAZOLE ARROW 1 %, poudre pour application cutanée ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : dérivés imidazole, antifongique local, code ATC : D01AC03.

Ce médicament contient un antifongique (actif contre les champignons) de la famille des imidazolés.

Ce médicament est préconisé dans le traitement ou le traitement d'appoint de certaines mycoses (affections cutanées dues à des champignons).

### **Candidoses :**

- Traitement des mycoses des plis macérées : intertrigo génital, sous-mammaire, interdigital, etc...

Dans certains cas, il est recommandé de traiter simultanément le tube digestif.

### **Dermatophyties :**

- Traitement :
  - Intertrigo macéré génital et crural.
  - Intertrigo des orteils.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER ECONAZOLE ARROW 1 %, poudre pour application cutanée ?

**N'utilisez jamais ECONAZOLE ARROW 1 %, poudre pour application cutanée dans les cas suivants :**

- Si vous êtes allergique au nitrate d'éconazole ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

## Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de d'utiliser ECONAZOLE ARROW 1 %, poudre pour application cutanée :

- chez l'enfant
- sur une grande surface de peau
- sur une peau lésée (abîmée)
- dans les situations où le phénomène d'occlusion locale peut se reproduire (par exemple sujets âgés, escarres, lésions sous-mammaires).

Dans ces cas, il est impératif de respecter les recommandations et la posologie indiquée dans la notice car le produit pénètre plus facilement dans la peau.

- Vous devez arrêter d'utiliser ce médicament si une allergie (reconnaisable par des rougeurs, des boutons...) ou une irritation apparaissent.
- Ne pas appliquer dans l'œil, le nez ou en général sur des muqueuses.
- Candidoses: il est déconseillé d'utiliser un savon à pH acide (pH favorisant la multiplication du Candida).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

## Enfants et adolescents

Sans objet.

### **Autres médicaments et ECONAZOLE ARROW 1 %, poudre pour application cutanée**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Prévenez votre médecin si vous prenez un médicament pour fluidifier le sang, les antivitamines K (comme acénocoumarol, fluindione, warfarine) car ECONAZOLE ARROW 1 %, poudre pour application cutanée peut modifier l'action des antivitamines K chez certaines personnes. Par conséquent, vous devrez surveiller fréquemment l'INR (examens sanguins). Selon votre situation, votre médecin peut également décider de modifier la dose de votre antivitamine K pendant ou après le traitement par ECONAZOLE ARROW 1 %, poudre pour application cutanée.

### **ECONAZOLE ARROW 1 %, poudre pour application cutanée avec des aliments, boissons et de l'alcool**

Sans objet.

### **Grossesse et allaitement**

Compte tenu d'un passage systémique limité mais possible après application par voie topique et du recul clinique, l'utilisation d'ECONAZOLE ARROW 1 %, poudre pour application cutanée, poudre pour application locale en flacon poudreux n'est pas recommandée au cours de la grossesse ou de l'allaitement, sans l'avis de votre médecin.

Ne pas appliquer sur les seins en période d'allaitement.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Sans objet.

### **ECONAZOLE ARROW 1 %, poudre pour application cutanée contient :**

Sans objet.

## **3. COMMENT UTILISER ECONAZOLE ARROW 1 %, poudre pour application cutanée ?**

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

### **Posologie**

Pour USAGE EXTERNE UNIQUEMENT : il s'applique directement sur la peau.

Respectez bien les étapes suivantes pour l'application :

1. Nettoyez la zone atteinte ainsi que son contour, puis séchez bien la peau avant l'application.
2. Appliquez ECONAZOLE ARROW 1 % sur et autour de la zone atteinte 2 fois par jour.

Agiter le flacon avant emploi.

Bien refermer le flacon après chaque utilisation.

	<b>DUREE DE TRAITEMENT</b>
Candidoses :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 à 2 semaines</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mycoses des plis macérées : intertrigo génital, sous-mammaire, interdigital...</li> </ul>	
Dermatophyties : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intertrigo macéré génital et crural.</li> <li>• Intertrigo des orteils.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 à 3 semaines</li> <li>• 3 semaines</li> </ul>

L'utilisation régulière de produit pendant toute la durée du traitement est déterminante pour la réussite du traitement.

**En cas de non amélioration, consultez un médecin.**

**Si vous avez respiré ECONAZOLE ARROW 1 % accidentellement :**

Consultez rapidement le médecin car le talc contenu dans la poudre pourrait bloquer votre respiration (particulièrement chez les nourrissons et les enfants).

**Si vous avez avalé ECONAZOLE ARROW 1 % accidentellement :**

Consultez le médecin afin qu'il vous prescrive un traitement adapté aux effets indésirables qui peuvent survenir suite à cette ingestion.

**Si vous avez accidentellement projeté ECONAZOLE ARROW 1 % dans les yeux :**

- Lavez à l'eau claire ou avec une solution saline.
- Si cela ne suffit pas, consultez un médecin.

**Si vous avez utilisé plus de ECONAZOLE ARROW 1 %, poudre pour application cutanée que vous n'auriez dû :**

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

**Si vous oubliez d'utiliser ECONAZOLE ARROW 1 %, poudre pour application cutanée :**

N'utilisez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié d'utiliser.

**Si vous arrêtez d'utiliser ECONAZOLE ARROW 1 %, poudre pour application cutanée :**

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations <à votre médecin, votre pharmacien ou à votre infirmier/ère.

#### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

**Les effets indésirables fréquents (1 à 10 utilisateurs sur 100) sont :**

- des démangeaisons,
- une sensation de brûlure,
- une douleur au site d'application.

**Les effets indésirables peu fréquents (1 à 10 utilisateurs sur 1 000) sont :**

- des rougeurs,
- un inconfort,
- un gonflement au site d'application.

**Les effets indésirables dont la fréquence n'est pas déterminée sont :**

- une allergie (hypersensibilité),
- un gonflement de la gorge ou du visage (angioedème),
- une éruption sur la peau,
- une urticaire,
- des cloques,

- la peau qui pèle (exfoliation).

### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : [www.ansm.sante.fr](http://www.ansm.sante.fr)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## **5. COMMENT CONSERVER ECONAZOLE ARROW 1 %, poudre pour application cutanée ?**

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'étiquette, l'emballage, le flacon après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

## **6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS**

### **Ce que contient ECONAZOLE ARROW 1 %, poudre pour application cutanée**

- La substance active est :

Nitrate d'éconazole..... 1 g  
Pour 100 g de poudre pour application cutanée.

- Les autres composants sont : Talc, silice colloïdale anhydre, oxyde de zinc.

### **Qu'est-ce que ECONAZOLE ARROW 1 %, poudre pour application cutanée et contenu de l'emballage extérieur**

Ce médicament se présente sous forme de poudre pour application cutanée. Flacon de 30 g.

### **Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché**

#### **ARROW GENERIQUES**

26 AVENUE TONY GARNIER  
69007 LYON

### **Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché**

#### **ARROW GENERIQUES**

26 AVENUE TONY GARNIER  
69007 LYON

### **Fabricant**

#### **THEPENIER PHARMA INDUSTRIE**

SAINT-LANGIS-LES-MORTAGNE  
61400 MORTAGNE

### **Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen**

Sans objet.

### **La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :**

[à compléter ultérieurement par le titulaire]  
{mois AAAA}.

### **Autres**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).