### Dénomination du médicament

PEVARYL 1 %, poudre pour application cutanée en flacon poudreur

Nitrate déconazole

### Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant dutiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en votre médecin ou votre pharmacien. Ceci sapplique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

### Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que PEVARYL 1 %, poudre pour application cutanée en flacon poudreur et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant PEVARYL 1 %, poudre pour application cutanée en flacon poudreur ?
3. Comment utiliser PEVARYL 1 %, poudre pour application cutanée en flacon poudreur ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver PEVARYL 1 %, poudre pour application cutanée en flacon poudreur ?
6. Contenu de lemballage et autres informations.

# 1. QUEST-CE QUE PEVARYL 1 %, poudre pour application cutanée en flacon poudreur ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique : ANTIFONGIQUE A USAGE TOPIQUE, DERIVES IMIDAZOLES ET TRIAZOLES code ATC : D01AC03.

Ce médicament contient un antifongique (actif contre les champignons) de la famille des imidazolés.

Ce médicament est indiqué dans le traitement de certaines mycoses de la peau (affections cutanées dues à des champignons).

Candidoses :
Traitement des mycoses des plis macérées : intertrigo génital, sous-mammaire, interdigital.

Concernant les infections des plis de laine, un traitement antifongique par voie orale est nécessaire pour traiter un éventuel foyer digestif et/ou vaginal, et ainsi éviter toute récidive.

Dermatophyties :

Traitement :

- Intertrigo macéré génital et crural.

- Intertrigo des orteils

# 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DUTILISER PEVARYL 1 %, poudre pour application cutanée en flacon poudreur ?

Nutilisez jamais PEVARYL 1 %, poudre pour application cutanée en flacon poudreur :

si vous êtes allergique au nitrate déconazole ou à lun des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant dutiliser PEVARYL 1 %, poudre pour application cutanée en flacon poudreur.

Faites attention avec PEVARYL 1 %, poudre pour application cutanée en flacon poudreur :

chez lenfant,
sur une grande surface de peau,
sur une peau lésée (abîmée),
dans les situations où le phénomène docclusion locale peut se reproduire (par exemple sujets âgés, escarres, lésions sous-mammaires).

Dans ces cas, il est impératif de respecter les recommandations et la posologie indiquée dans la notice car le médicament pénètre plus facilement dans la peau.

Vous devez arrêter dutiliser ce médicament si une allergie (reconnaissable par des rougeurs, des boutons) ou une irritation apparaissent.
Ne pas appliquer dans lil, le nez ou en général sur des muqueuses.
Candidoses : il est déconseillé d'utiliser un savon à pH acide (pH favorisant la multiplication du Candida).
· Ce médicament contient un parfum contenant de l'alcool cinnamique et du linalol. L'alcool cinnamique et linalol peuvent provoquer des réactions allergiques.

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant dutiliser PEVARYL 1 %, poudre pour application cutanée en flacon poudreur.

Enfants et adolescents

Sans objet.

Autres médicaments et PEVARYL 1 %, poudre pour application cutanée en flacon poudreur

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

PEVARYL 1 %, poudre pour application cutanée en flacon poudreur avec des aliments et boissons

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Compte tenu dun passage systémique limité mais possible après application par voie cutanée et du recul clinique, lutilisation du PEVARYL 1 %, poudre pour application cutanée en flacon poudreur nest pas recommandée au cours de la grossesse ou de lallaitement, sans lavis de votre médecin.

Ne pas appliquer sur les seins en période dallaitement.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant dutiliser ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

# 3. COMMENT UTILISER PEVARYL 1 %, poudre pour application cutanée en flacon poudreur ?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie

Appliquer PEVARYL sur la peau 2 à 3 fois par jour, sans dépasser 3 applications par jour. Le traitement doit être poursuivi pendant 2 à 4 semaines.

Mode dadministration

Pour USAGE EXTERNE UNIQUEMENT : il sapplique directement sur la peau.

Nettoyez la zone atteinte ainsi que son contour, puis séchez bien la peau avant lapplication.

Lutilisation régulière de ce médicament pendant toute la durée du traitement est déterminante pour la réussite du traitement.

En cas de non amélioration, consultez un médecin.

Si vous avez respiré PEVARYL 1 %, poudre pour application cutanée en flacon poudreur accidentellement :

Consultez rapidement le médecin car le talc contenu dans la poudre pourrait bloquer votre respiration (particulièrement chez les nourrissons et les enfants).

Si vous avez avalé PEVARYL 1 %, poudre pour application cutanée en flacon poudreur accidentellement :

Consultez le médecin afin quil vous prescrive un traitement adapté aux effets indésirables qui peuvent survenir suite à cette ingestion.

Si vous avez accidentellement projeté PEVARYL 1 %, poudre pour application cutanée en flacon poudreur dans les yeux :

Lavez à leau claire ou avec une solution saline.

Si cela ne suffit pas, consultez un médecin.

Si vous avez utilisé plus de PEVARYL 1 %, poudre pour application cutanée en flacon poudreur que vous nauriez dû

Sans objet.

Si vous oubliez dutiliser PEVARYL 1 %, poudre pour application cutanée en flacon poudreur

Sans objet.

Si vous arrêtez dutiliser PEVARYL 1 %, poudre pour application cutanée en flacon poudreur

Sans objet.

Si vous avez dautres questions sur lutilisation de ce médicament, demandez plus dinformations à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets indésirables fréquents (1 à 10 utilisateurs sur 100) sont :

des démangeaisons,
une sensation de brûlure,
une douleur au site dapplication.

Les effets indésirables peu fréquents (1 à 10 utilisateurs sur 1 000) sont :

des rougeurs,
un inconfort,
un gonflement au site dapplication.

Les effets indésirables dont la fréquence nest pas déterminée sont :

une allergie (hypersensibilité),
un gonflement de la gorge ou du visage (angidème),
une éruption sur la peau,
un urticaire,
des cloques,
la peau qui pèle (exfoliation).

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci sapplique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence

nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : www.signalement-sante.gouv.fr.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage dinformations sur la sécurité du médicament.

# 5. COMMENT CONSERVER PEVARYL 1 %, poudre pour application cutanée en flacon poudreur ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

Nutilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur lemballage après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-légout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien déliminer les médicaments que vous nutilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger lenvironnement.

# 6. CONTENU DE LEMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

## Ce que contient PEVARYL 1 %, poudre pour application cutanée en flacon poudreur

La substance active est :

Nitrate déconazole..... 1,0 g

Pour 100 g de poudre pour application cutanée.

Les autres composants sont :
Silice colloïdale anhydre, parfum, oxyde de zinc, talc

## Quest-ce que PEVARYL 1 %, poudre pour application cutanée en flacon poudreur et contenu de lemballage extérieur

## Titulaire de lautorisation de mise sur le marché

JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE

1, RUE CAMILLE DESMOULINS

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

## Exploitant de lautorisation de mise sur le marché

JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE

1, RUE CAMILLE DESMOULINS

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

## Fabricant

LUSOMEDICAMENTA SOCIEDADE TECNICA FARMACEUTICA, S.A.

ESTRADA CONSIGLIERI PEDROSO

N°69 - B, QUELUZ DE BAIXO

2730-055 BARCARENA

PORTUGAL

## Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

## La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

## Autres

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de lANSM (France).

Retour en haut de la page

CITYPHARMA
Votre pharmacie au cœur de Paris